

# CONTRIBUTION A LA CONNAISSANCE

## DES HISTÉRIDES

5<sup>e</sup> mémoire (1)

### ÉTUDE DU GENRE *OMALODES* ER.

par H. DESBORDES.

Le genre *Omalodes* a été créé par ERICHSON en 1834; il comprenait seulement dix espèces. S. DE MARSEUL en a donné en 1853, dans sa Monographie, un tableau dichotomique qui s'appliquait à trente espèces. Ce dernier nombre est aujourd'hui plus que doublé, les descriptions faites par les auteurs subséquents l'ayant porté à soixante-quatre. Il est ainsi devenu impossible d'identifier un *Omalodes* avec le tableau de MARSEUL; après de nombreux essais, je suis parvenu à établir un nouveau tableau, dans lequel figurent toutes les espèces actuellement connues et, bien que, en certaines parties, il ne me donne pas entière satisfaction, je crois que sa publication pourra rendre quelques services.

Si, comme l'a écrit DE MARSEUL, les différentes espèces du genre *Omalodes* ont toutes un facies et des caractères les séparant à première vue de celles des autres genres de la famille des *Histeridae*, elles sont par contre souvent fort difficiles à distinguer les unes des autres. Les espèces sont toutes uniformément noires; je crois qu'il n'y a de caractères séparatifs ni dans les antennes, ni dans les cuisses, ni dans les tarses, ni pour ainsi dire jamais dans les arceaux abdominaux. En outre, et surtout, il existe des espèces pourvues d'un caractère saillant et par suite, semble-t-il, aisément reconnaissables; mais, quand on a à sa disposition un grand nombre d'individus, on en rencontre parfois un ou deux chez lesquels ce caractère fait partiellement ou même complètement défaut. Aussi doit-il être entendu que les caractères dont je me suis servi sont ceux que présentent très habituellement, mais non pas immuablement, les espèces auxquelles ils s'appliquent. Chaque fois que j'ai rencontré une exception, je l'ai signalée en note.

Les *Omalodes* sont tous spéciaux à l'Amérique centrale et méridionale ou aux îles américaines, à l'exception d'un seul, *O. marqui-*

(1) Pour les quatre premiers mémoires, cf. *Ann. Soc. ent. Fr.*, [1915], p. 463; — [1916], p. 297; — [1917], p. 165; — [1918], p. 341.

*sicus* Mars., dont le *type* provient des îles Marquises, qui sont distantes d'environ 6.000 kilomètres de la côte occidentale de l'Amérique du Sud; je ne connais d'ailleurs aucun autre exemplaire de cette espèce.

S. DE MARSEILLE a, pour quelques-uns des *Omalodes*, indiqué qu'ils vivaient soit dans les bouses, soit dans les « végétaux charnus en décomposition », soit sous les pierres; les descripteurs subséquents n'ont eu — ou n'ont donné — aucun renseignement sur l'habitat des espèces qu'ils décrivaient. Aussi le catalogue qu'on trouvera à la suite du tableau de détermination ne contient-il aucune indication à cet égard.

TABLEAU DE DÉTERMINATION

1. Propygidium marqué de deux tubercules. — Prosternum généralement bistrié. Corps ovale ou oblong. (Sous-genre <i>Cornillus</i> Lew.).....	62.
— Propygidium non tuberculé.....	2.
2. Espèces ayant à la fois le prosternum bistrié et la strie mésosternale entière. — Corps oblong, déprimé sur la région suturale. (Sous-genre <i>Diplogrammicus</i> Lew.).....	60.
— Espèces n'ayant pas à la fois le prosternum bistrié et la strie mésosternale entière ( <i>Omalodes</i> s. str.).....	3.
3. Prosternum bistrié (1).....	4.
— Prosternum sans stries.....	13.
4. Élytres ayant chacun une série transversale peu régulière de 4-7 gros points vers le sommet. Long. 6-7,5 mm....	
..... <i>lucidus</i> Er. var. <b>Le Moulti</b> *, n. var. (2)	
— Élytres sans série transversale de gros points au sommet.	5.
5. Pronotum entièrement lisse. — Strie frontale rétroangulée. Propygidium non fovéolé, marqué de deux impressions légères. Long. 8,5 mm.....	<i>consanguineus</i> Mars.*
— Pronotum ponctué latéralement, au moins dans la région angulaire antérieure.....	6.
6. Ponctuation du pronotum localisée dans la région angu-	

(1) Dans cette section se trouve placé *O. bifoveolatus* Mars. J'en possède cependant un exemplaire dont le prosternum n'est pas bistrié, mais il forme une exception unique parmi les cent vingt-cinq individus que j'ai examinés et je le considère comme une aberration individuelle.

(2) Voir la description ci-après, p. 56.

- laire antérieure..... 7.
- Ponctuation du pronotum occupant toute la bordure latérale, toujours plus atténuée vers la base. — Strie subhumérale externe des élytres simple..... 8
7. Taille plus petite. Ponctuation du pronotum extrêmement fine, parfois presque nulle. Strie subhumérale externe des élytres apicale, avec un appendice arqué à la base. Stries dorsales internes indiquées, surtout au sommet, par des séries de points. Long. 5-6,5 mm..... *seriatus* Schmidt
- Taille plus grande. Ponctuation du pronotum forte, presque rugueuse. Strie subhumérale externe des élytres simple. Stries dorsales internes nullement indiquées, même au sommet. Long. 8 mm..... *bisulcatus* \*. n. sp. (1)
8. Propygidium bifovéolé. — Élytres sans strie apicale, marqués vers le sommet de quelques points plus ou moins alignés..... 9.
- Propygidium régulièrement arrondi ou plus ou moins biimpressionné, mais nullement bifovéolé..... 10.
9. Pronotum marqué, vers le milieu de chaque côté, d'une fovéole très nette, généralement située au bord interne de la ponctuation latérale, qui est très forte et dense. Long. 6-8 mm..... *bifoveolatus* \* Mars. (2)
- Pronotum non fovéolé latéralement; sa ponctuation moins forte et moins dense. Long. 6-8 mm..... *peruvianus* \* Mars.
10. Strie frontale rétroangulée au milieu..... 11.
- Strie frontale non rétroangulée, soit entière, soit interrompue au milieu..... 12.
11. Taille petite. Élytres avec une strie subhumérale interne apicale; les trois stries dorsales internes indiquées par des points apicaux. Propygidium densément ponctué en arrière et sur les côtés, avec une aire distincte presque imponctuée. Long. 6,25-6,75 mm..... *areolatus* Schmidt (3)

(1) Voir la description ci-après, p. 56.

(2) Voir la note sous le n° 3.

(3) J. SCHMIDT dit dans sa description (*Ent. Nachr.*, XV [1889], p. 363) que son exemplaire a le prosternum brièvement bistré, mais qu'il ne sait si ce caractère se retrouve chez le deuxième exemplaire, qui est dans la collection G. Lewis. Notre savant collègue anglais, à qui j'avais écrit à ce sujet, a bien voulu me répondre que le prosternum de son exemplaire n'était nullement strié. Je fais donc figurer deux fois cette espèce dans le présent tableau (voir plus loin sous le n° 39).

- Taille grande. Élytres sans strie subhumérale interne; les trois stries dorsales internes nulles. Propygidium assez irrégulièrement ponctué, mais sans aire lisse spéciale. — Ponctuation du pronotum extrêmement fine. Long. 10,5 mm..... *mestino* Lew.
12. Tête marquée d'une fovéole circulaire plus ou moins profonde; strie frontale soit entière, soit légèrement obsolète en avant. Strie subhumérale interne des élytres indiquée par quelques points apicaux; trois premières stries dorsales terminées apicalement par des lignes de points; pas de strie apicale. Propygidium légèrement bimpressionné. Long. 8 mm..... *amazonius* \* Mars.
- Tête marquée d'une impression sulciforme longitudinale; strie frontale largement interrompue, marquée seulement près des yeux. Strie subhumérale interne nulle; strie apicale très nette. Propygidium non impressionné. Long. 8 mm..... *vitreolucens* Casey
13. Strie du mésosternum entière. Strie subhumérale externe des élytres entière, interne bien marquée, reliée à la strie humérale par une ligne de points et raccourcie avant le sommet; strie suturale représentée par quelques points linéaires. Long. 6-7 mm..... *fortunatus* Lew. (1)
- Strie du mésosternum nulle ou largement interrompue au milieu..... 14.
14. Strie du mésosternum nulle. — Strie frontale obtusément rétroangulée. Strie subhumérale externe ne dépassant pas le milieu; interne et suturale nulles. Long. 9 mm..... *Cerqueirae*, n. sp. (2)
- Strie du mésosternum largement interrompue au milieu, mais bien visible sur les côtés..... 15.
15. Pygidium entièrement lisse..... 16.
- Pygidium plus ou moins ponctué, quelquefois très finement ou sur un espace réduit, mais non entièrement lisse. 17.
16. Strie frontale interrompue au milieu. Pronotum entièrement lisse. Élytres avec une strie apicale. Propygidium non fovéolé, soit entièrement lisse, soit avec quelques

(1) *O. fortunatus* Lew. présente la plupart des caractères du sous-genre *Diplogrammicus* Lew.; cependant cette espèce n'a pas le prosternum bistricé et son facies est bien celui de la plupart des *Omalodes* s. str.

(2) Voir la description, p. 57.

- points clairsemés aux angles antérieurs. Long. 6-7 mm.  
 ..... *laevinotus* \* Mars.
- Strie frontale entière, à peine rétroangulée. Pronotum très finement ponctué sur les côtés. Élytres sans strie apicale. Propygidium bifovéolé, lisse. Long. 6-7 mm....  
 ..... *perpolitus* Schmidt
17. Pronotum entièrement lisse..... 18.  
 — Pronotum plus ou moins ponctué le long des côtés..... 23.
18. Propygidium bifovéolé, assez densément ponctué sur les côtés, plus éparsément au milieu. — Stries dorsales des élytres extrêmement fines..... 19.  
 — Propygidium sans fovéoles, parfois avec deux impressions latérales vagues..... 20.
19. Strie frontale légèrement rétroangulée, un peu obsolète au milieu. Mésosternum très court, son bord postérieur presque tangent au milieu au bord antérieur. Long. 5,5-6,5 mm..... *brevisternum* Schmidt  
 Strie frontale profondément rétroangulée. Mésosternum de longueur normale. Long. 8-9 mm..... *laevicollis* Bickh.
20. Stries dorsales internes des élytres remplacées par de légères côtes, qui déterminent deux ou trois pans coupés bien visibles sous un certain angle. — Strie frontale non rétroangulée, obsolète en avant. Épaules très saillantes avec une forte dépression en dessous. Stries dorsales externes à peine visibles. Tibias antérieurs armés de cinq dents. Long. 7,25 mm..... *humerosus* Schmidt  
 — Stries dorsales internes non remplacées par des côtes élevées..... 21.
21. Strie frontale nettement rétroangulée Propygidium fortement et éparsément ponctué, sauf une bande lisse assez nette au sommet. Tibias antérieurs armés de cinq dents. Long. 5,5-6,75 mm..... *Fassli* Bick.\*  
 — Strie frontale non ou à peine rétroangulée. Propygidium plus ou moins ponctué, sans bande lisse déterminée au sommet. Tibias antérieurs armés de quatre dents..... 22.
22. Front lisse, non excavé, sa strie circulaire un peu interrompue au milieu (1). Strie subhumérale externe des

(1) Je possède un exemplaire de *O. planifrons* Mars. chez lequel, contrairement à ce qu'on observe chez le *type*, la strie frontale, non interrompue, est obtusément rétroangulée au milieu.

- élytres très longue, irrégulière, atteignant presque la base; suturale indiquée par une série de quelques points apicaux. Propygidium et pygidium fortement et densément ponctués. Long. 8 mm. .... *planifrons* \*Mars.
- Front pointillé, excavé, sa strie formée de deux lignes obliques commençant près du milieu de l'œil et se rejoignant en avant. Strie subhumérale externe apicale, ne dépassant pas le milieu; suturale nulle. Propygidium beaucoup plus densément ponctué sur les côtés qu'au milieu; pygidium plus également ponctué. Long. 7,5 mm. .... *obliquistrius* Lew.
23. Élytres avec une strie apicale généralement entière. — Strie subhumérale interne non indiquée. Propygidium non fovéolé, parfois à peine sensiblement biimpressionné. .... 24.
- Élytres sans trace de strie apicale. .... 30.
24. Strie apicale partant du bord externe et cessant à égale distance de ce bord et de la suture. Strie suturale indiquée par quelques points apicaux, ainsi que les 4<sup>e</sup> et 5<sup>e</sup> dorsales. — Strie frontale semicirculaire, vaguement interrompue en avant. Ponctuation du pronotum rare et très fine, localisée dans les angles antérieurs. Long. 6 mm. .... *simplex* Lew.
- Strie apicale occupant tout le bord postérieur; 4<sup>e</sup>, 5<sup>e</sup> dorsales et suturale nulles. .... 25.
25. Forme allongée. Stries dorsales bien marquées. .... 26.
- Forme ovale. Stries dorsales extrêmement fines, presque obsolètes. — Strie frontale plus ou moins rétroangulée. .... 27.
26. Taille plus grande. Strie frontale rétroangulée. Ponctuation latérale du pronotum diminuant progressivement de largeur et de force, mais atteignant cependant la base. Ponctuation du propygidium laissant vers le milieu une aire lisse, assez mal délimitée, qui atteint le sommet et parfois aussi la base. Long. 8-10 mm. .... *haïtianus* \*Mars.
- Taille plus petite. Strie frontale non rétroangulée, légèrement interrompue au milieu. Ponctuation du pronotum limitée à la région des angles antérieurs, ne dépassant pas le milieu. Propygidium éparsément ponctué, sans aire lisse proprement dite. Long. 7,5 mm. .... *oblongus* Lew.

27. Taille plus grande. Propygidium uniquement ponctué sur les côtés, la ponctuation forte. Ponctuation du pygidium laissant une bande transversale lisse à la base et au sommet. — Pronotum densément pointillé sur les côtés.  
— Long. 10-11 mm. . . . . *optatus* Lew. (1)
- Taille plus petite (5,5-8 mm.). Propygidium inégalement ponctué, mais généralement avec au moins quelques points sur le disque. Ponctuation du pygidium ne laissant pas de bande lisse à la base et au sommet. . . . . 28.
28. Ponctuation latérale du pronotum allant en diminuant vers la base, mais atteignant celle-ci. — Ponctuation du propygidium assez variable. Long. 5,5-8 mm. — (*laevigatus* || Er., *Klugi* \*Mars.) . . . . . *ruficlavis* \*Mars. (2)
- Ponctuation latérale du pronotum localisée dans les angles antérieurs, n'atteignant pas la base. . . . . 29.
29. Forme ovale, allongée. Long. 5,5-7 mm. — (*angulatus* || Payk.) . . . . . *laevigatus* Quens. (3)
- Forme presque orbiculaire. Long. 6,5-8 mm. — (*laevigatus* || Mars.) . . . . . *Soulouquei* \*Mars.
30. Strie suturale des élytres plus ou moins marquée, indiquée au moins par quelques points apicaux en série. . . . . 31.  
— Strie suturale nullement indiquée. . . . . 43.
31. Stries dorsales internes des élytres représentées par de légères côtes élevées, déterminant deux ou trois pans coupés bien visibles sous un certain angle. — Strie frontale très nettement rétroangulée. Côtés du pronotum très fai-

(1) Bien que la description n'en fasse pas mention, *O. optatus* Lew. a une strie apicale aux élytres, ainsi que l'auteur a bien voulu me l'écrire.

(2) J'ai vu les *types* des *O. ruficlavis* Mars. et *O. Klugi* Mars. (*laevigatus* || Er.) au Muséum de Paris. Les différences signalées par l'auteur soit dans ses descriptions, soit dans une note manuscrite que j'ai eue à ma disposition, me paraissent trop faibles pour qu'il y ait lieu de conserver ces deux espèces.

(3) Le nom de *O. laevigatus* a été donné à trois espèces par QUENSEL, ERICHSON et DE MARSELL. J'ai vu le *type* de *O. Soulouquei* (= *laevigatus* || Mars.) dans la collection de Marseille, où se trouve aussi un exemplaire de *O. laevigatus* Quens. Ce dernier me paraît, d'après la description, avoir été exactement nommé et je ne vois entre lui et *O. Soulouquei* Mars. de différence que dans la forme générale du corps, ovale, assez allongée chez *O. laevigatus* Quens., courte, ramassée chez *O. Soulouquei* Mars.



- blement ponctués. Épaules saillantes, avec une dépression très marquée en dessous. Stries dorsales externes fortes, bien marquées. Long. 5,5-6 mm. . . . . *faustus* Er.
- Stries dorsales internes nullement élevées en côtes latérales. . . . . 32.
32. Élytres avec une fovéole profonde à la base de la 3<sup>e</sup> strie.  
— Strie frontale rétroangulée. . . . . 33.
- Élytres sans fovéole à la base de la 3<sup>e</sup> strie. . . . . 34.
33. Côtés du pronotum fortement sinués; angles antérieurs marqués d'une dépression traversée par la strie latérale dont le rebord forme une sorte de carène. Propygidium et pygidium à peine ponctués, complètement lisses en arrière, celui-là non fovéolé. Long. 7 mm. . . . .  
. . . . . *sinuaticollis* \*Mars.
- Côtés du pronotum non ou à peine sinués; angles antérieurs sans dépression spéciale. Propygidium et pygidium entièrement et assez régulièrement ponctués, celui-là profondément bifovéolé et impressionné entre les fovéoles. Long. 6-6,5 mm. . . . . *foveipennis* Lew.\*
34. Stries dorsales des élytres uniquement composées de points alignés. — Strie frontale rétroangulée. . . . . 35.
- Stries dorsales plus ou moins linéaires, jamais uniquement composées de points alignés. . . . . 37.
35. Propygidium fortement bifovéolé. Long. 4-7 mm. *pulvinatus* Er.  
— Propygidium non fovéolé, au plus légèrement bimpressionné. . . . . 36.
36. Front et épistome fortement et largement excavés longitudinalement. Côtés du pronotum rectilignes. Long. 5-6 mm. . . . . *monilifer* \*Mars.
- Front bombé, plus faiblement canaliculé ainsi que l'épistome. Côtés du pronotum légèrement arqués. Long. 4-6 mm. . . . . *mendax* \*Mars. (1)
37. Strie frontale rétroangulée. . . . . 38.
- Strie frontale soit entière, soit interrompue au milieu, non rétroangulée. . . . . 41.

(1) *O. mendax* Mars. est bien voisin de *O. monilifer* Mars., ainsi que j'ai pu m'en rendre compte en comparant les *types* des deux espèces. Cependant, pour se prononcer sur leur réunion éventuelle, il serait nécessaire d'avoir sous les yeux une série un peu nombreuse.



38. Trois premières stries dorsales des élytres entières et crénelées. Propygidium bifovéolé. Premier segment ventral strigusement ponctué. — Forme ovale. Long. 5,75 mm. . . . . *chapadae* Lew.  
 — Troisième strie des élytres raccourcie en arrière ou terminée par des points faibles alignés. Propygidium non fovéolé. Premier segment ventral lisse ou indistinctement pointillé . . . . . 39.
39. Propygidium avec un espace presque lisse, partant du bord antérieur et s'étendant jusqu'aux deux tiers postérieurs, garni de points peu nombreux et irrégulièrement dispersés; très densément ponctué sur le reste de sa surface. Long. 6,25-6,75 mm. . . . . *areolatus* Schmidt (1)  
 — Propygidium à ponctuation peu dense, mais régulièrement distribuée sur toute la surface. . . . . 40.
40. Forme allongée, presque cylindrique. Épaules à peine saillantes. Angles antérieurs du pronotum creusés, la fossette traversée par la strie latérale. Prosternum non déprimé à la base. Mésosternum sensiblement plus long que chez les autres espèces. Long. 6-7 mm. . . . . *exul* Mars.  
 — Forme ovale, courte. Épaules nettement saillantes. Angles antérieurs du pronotum non ou à peine creusés. Prosternum avec une large dépression à la base. Mésosternum de longueur normale. Long. 7 mm. . . . . *depressisternus* \*Mars.
41. Ponctuation du pronotum très fine, localisée dans les angles antérieurs, n'atteignant pas la base. Strie suturale des élytres linéaire, raccourcie mais bien nette. — Propygidium bifovéolé. Long. 7 mm. . . . . *marquisicus* \*Mars.  
 — Ponctuation du pronotum forte, allant en diminuant vers la base qu'elle atteint. Strie suturale formée de quelques points apicaux alignés. . . . . 42.
42. Propygidium non fovéolé, légèrement biimpressionné. Long. 6-7 mm. . . . . *punctistrius* \*Mars.  
 — Propygidium nettement bifovéolé. — Élytres sans strie subhumérale interne. Long. 4,5-7,5 mm. . . . . *foveola* Er. (2)

(1) Voir ci-dessus, sous le n° 11.

(2) *O. foveola* Er. a généralement la strie suturale indiquée par quelques points. Il arrive cependant que cette strie fasse complètement défaut. Aussi ai-je fait figurer l'espèce deux fois dans le présent tableau (Voir ci-après, sous le n° 47).

- Élytres avec un rudiment apical de strie subhumérale interne. — (*conicicollis* \*Mars.)..... Var. *brasilianus* \*Mars. (1)
43. Propygidium marqué de deux fovéoles régulièrement arrondies..... 44.  
— Propygidium biimpressionné ou non, mais non marqué de deux fovéoles régulièrement arrondies (2)..... 50.
44. Élytres marqués vers le sommet d'une série transversale, peu régulièrement alignée, de points forts, presque fovéiformes. — Carène prosternale ponctuée. Long. 5-10 mm. .... *lucidus* Er. (3)  
— Élytres non marqués vers le sommet d'une série transversale de points forts..... 45.

(1) J'ai tout lieu de croire que DE MARSEUL n'a eu à sa disposition qu'un nombre petit d'individus lorsqu'il a décrit ses *O. brasilianus* et *conicicollis*. Les deux descriptions, à la taille près, sont presque identiques et ne différencient guère ces deux espèces de *O. foveola* Er. Il m'est passé sous les yeux plusieurs centaines d'*Omalodes* de tailles très différentes et ne pouvant appartenir qu'à l'une ou à l'autre de ces trois espèces; d'autre part, j'ai eu à ma disposition les *types* des deux premières et je ne crois pas qu'il y ait lieu de considérer celles-ci comme autre chose qu'une variété unique du *foveola* caractérisée par un rudiment de strie subhumérale interne aux élytres.

(2) Cette coupe est basée sur un caractère peu satisfaisant et je suis forcé de reconnaître que la différence entre un propygidium faiblement bifovéolé et un propygidium biimpressionné n'est pas grande. J'aurais voulu trouver un caractère plus tranché; je n'y suis pas parvenu, malgré toutes mes recherches.

J'entends par fovéole une cavité circulaire bien marquée, dont les bords sont régulièrement relevés; par impression, une cavité beaucoup moins sensible, non régulièrement circulaire, dont les bords sont généralement relevés d'une façon inégale.

(3) Espèce de taille et de structure très variables. La bordure de points du pronotum est tantôt intégrale, tantôt concentrée sur la région antérieure. Je possède même un individu, venant de Colombie, qui a le pronotum et la carène prosternale lisses, et un autre, de la Guyane française, dont le pronotum est marqué de deux points enfoncés symétriquement placés; mais j'en ai vu plusieurs centaines et n'ai retrouvé ces anomalies chez aucun autre. La strie subhumérale interne est parfois nulle, parfois indiquée par deux ou trois points. La ponctuation du propygidium est généralement égale, mais quelquefois un peu plus éparses au milieu; ses fovéoles sont plus ou moins enfoncées.

Voir aussi, sous le n° 4, la variété que j'ai décrite de cette espèce.

45. Ponctuation du propygidium inégalement disposée, soit plus clairsemée au centre, soit entièrement nulle au milieu de la base. . . . . 46.  
 — Ponctuation du propygidium à peu près également répartie sur toute la surface, les points d'égale grosseur ou non. 48.
46. Strie frontale rétroangulée. Strie latérale du pronotum irrégulière, éloignée du bord (1). Propygidium et pygidium avec une aire à peu près lisse au bord antérieur. Long. 9 mm. . . . . *laceratus* Mars.  
 — Strie frontale non rétroangulée. Strie latérale du pronotum régulière, rapprochée du bord. Propygidium sans aire lisse nettement délimitée, mais à ponctuation beaucoup plus clairsemée au milieu que sur les côtés. Ponctuation du pygidium égale, sauf parfois à l'extrême sommet. . . . . 47.
47. Taille plus petite. Ponctuation du pronotum diminuant progressivement de largeur et de force du sommet à la base, mais atteignant néanmoins celle-ci sur une étendue assez notable. Angles antérieurs du pronotum faiblement creusés en dedans de la strie latérale. Long. 4,5-7,5 mm. . . . . *foveola* Er. (2)  
 — Taille plus grande. Ponctuation du pronotum soit limitée aux angles antérieurs, soit atteignant la base, mais en ce cas très fine et très réduite en ce point. Angles antérieurs du pronotum fortement creusés en dedans de la strie latérale. Long. 9 mm. . . . . *angulatus* F.
48. Strie subhumérale interne des élytres nulle. Fovéoles du propygidium légères, doublées d'un gros point enfoncé situé entre elles et le bord antérieur. — Pronotum sans fossettes spéciales, légèrement sinué sur les côtés. Long. 9 mm. . . . . *lapsans* \*Mars.  
 — Strie subhumérale interne des élytres bien marquée. Fovéoles du propygidium simples, bien marquées. . . . . 49.
49. Pronotum avec deux fovéoles de chaque côté, également

(1) DE MARSEUL a décrit cette espèce sur un exemplaire unique de la collection Chevrolat et il exprime lui-même des doutes sur la constance du caractère tiré de la strie latérale du pronotum. N'ayant pas vu le *type*, je ne puis que consigner ici son observation. *O. laceratus* Mars. pourrait bien n'être qu'un individu anormal de *O. omegu* Kirby.

(2) Voir plus haut, sous le n° 42 et les notes 1 et 2.

- et assez rapprochées du bord antérieur, la plus grosse derrière l'œil, la seconde entre celle-ci et le bord latéral; sa ponctuation latérale assez forte, mais non rugueuse. Long. 9 mm. . . . . *felix* Lew.
- Pronotum sans fovéoles, sa ponctuation rugueuse antérieurement. Long. 8-9 mm. . . . . **Wagneri**\*, n. sp. (1)
50. Strie subhumérale externe des élytres entière, interne apicale atteignant l'épaule, l'une et l'autre bien marquées. — Front légèrement déprimé, avec une légère trace de sillon. Ponctuation latérale du pronotum n'atteignant pas la base. Long. 9 mm. . . . . *extorris*\* Mars.
- Strie subhumérale externe des élytres apicale, ne dépassant pas le milieu: interne nulle ou réduite à un rudiment apical ou à une courte ligne de points. . . . . 51.
51. Front pointillé, avec une petite impression gémisée sur le vertex. Ponctuation latérale du pronotum limitée aux angles antérieurs. — Propygidium non impressionné, sa ponctuation grosse, inégalement espacée. Long. 6,5 mm. . . . . *praeivus* Mars.
- Front généralement lisse, plus ou moins unisilloné ou impressionné. Ponctuation latérale du pronotum atteignant la base. . . . . 52.
52. Propygidium lisse sur la plus grande partie de sa surface, fortement et éparsément ponctué sur les côtés, parfois assez sensiblement biimpressionné. — Front presque plan. Strie frontale subangulée ou sinuée, souvent obsolette au milieu. Long. 5,5-7 mm. . . . . *gagatinus* Er.
- Propygidium plus ou moins éparsément ponctué, jamais avec une aire médiane lisse occupant la majeure partie de sa surface. . . . . 53.
53. Strie latérale du pronotum cessant à une certaine distance de la base. — Strie frontale circulaire, avec une petite interruption en avant. Carène prosternale densément ponctué. Long. 5,5-6,5 mm. . . . . *clavulus* Lew.
- Strie latérale du pronotum atteignant la base. . . . . 54.
54. Front presque plan, à peine impressionné. . . . . 55.
- Front distinctement fovéolé ou sillonné. . . . . 57.
55. Ponctuation du propygidium et du pygidium grosse et

(1) Voir la description ci-après, p. 56.

- espacée. Long. 5.5-7 mm. . . . . *anthracinus* \*Mars.  
 — Ponctuation du propygidium et du pygidium beaucoup plus fine et plus dense. . . . . 56.
56. Pronotum assez finement et éparsément ponctué sur les côtés. Élytres sans calus huméral et sans pli spécial contre la suture. Propygidium partiellement et éparsément ponctué, lisse au bord postérieur. Long. 6 mm. — (*rotundatus* Lec.) . . . . . *sobrinus* Er.  
 — Pronotum densément ponctué sur les côtés. Élytres avec un léger calus huméral et marqués d'un petit pli au bord postérieur de la suture. Propygidium assez fortement, mais éparsément ponctué. Long. 6 mm. . . . . *serenus* Er. (1)
57. Pygidium avec le milieu de la base lisse ou tout au moins beaucoup plus finement ponctué que le reste de la surface.  
 — Impressions du propygidium bien marquées. . . . . 58.

(1) Quatre des espèces du genre *Omalodes* sont extrêmement voisines les unes des autres; ce sont : *O. sobrinus* Er., *O. serenus* Er., *O. gaganus* Er. et *O. anthracinus* Mars. *O. gaganus*, dont la description tient en quatre lignes, semblerait aisément reconnaissable à son propygidium lisse sur la plus grande partie de sa surface; je possède cependant une série d'une trentaine d'individus, venant de Mendes (Brésil), qui sont semblables au *type* d'*anthracinus*, sauf que chez celui-ci le propygidium est entièrement ponctué, tandis que, chez la plupart des exemplaires de Mendes, il présente au bord postérieur une bande lisse plus ou moins étroite, remontant parfois vers le milieu et, chez quelques-uns, envahissant toute la partie médiane, comme chez *O. gaganus*. On trouve ainsi dans cette série des passages évidents entre *O. gaganus* Er. et *O. anthracinus* Mars.

D'autre part, j'ai examiné d'assez nombreux spécimens d'*O. sobrinus* Er. et *O. serenus* Er., nommés par DE MARSEUL, G. LEWIS, J. SCHMIDT, H. BICKHARDT, et je n'arrive pas à trouver de caractères nets et constants pour séparer ces espèces. *O. serenus* aurait, d'après la description, les élytres pincés en forme de pli vers l'extrémité de la suture; je me demande si ce pli ne s'est pas trouvé accidentellement chez le *type*, car je ne l'ai retrouvé chez aucun des exemplaires qui m'ont été confiés ou cédés sous le nom de *serenus*. Je n'ai pu vérifier non plus, sur les exemplaires de *sobrinus* et de *serenus* que j'ai eus à ma disposition; les caractères distinctifs indiqués par DE MARSEUL dans son tableau des *Omalodes*. N'ayant pas vu les *types* des trois espèces d'ERICSON, je ne puis proposer aucune réunion en ce qui les concerne, non plus que la mise en synonymie de l'espèce de MARSEUL; mais je me contente d'utiliser dans mon tableau les caractères fournis par les descriptions d'ERICSON et de MARSEUL et je fais toutes réserves sur la valeur qu'il convient de leur attribuer.

- Pygidium sans aire spéciale lisse ou plus finement ponctuée au milieu de la base. . . . . 59.
58. 2<sup>e</sup> strie dorsale des élytres forte, subentière, terminée au sommet dans une fovéole assez bien marquée. Épaules peu saillantes, avec une très faible dépression en dessous. Long. 8-9,5 mm. — (*borealis* Lec.) . . . . . *omega* Kirby (1)
- 2<sup>e</sup> strie dorsale fine, cessant bien avant le sommet, où se trouve parfois dans son prolongement un point enfoncé. Épaules peu saillantes, avec une très faible dépression en dessous. Long. 8,5-9 mm. — (*texanus* \* Mars. — *lubricans* Casey) . . . . . *grossus* \* Mars.
59. Strie subhumérale externe des élytres assez longue, munie d'un rudiment basal; l'interne nulle ou représentée par quelques points en série. 3<sup>e</sup> strie dorsale continuée vers le sommet par une ligne de points. Ponctuation du propygidium forte et très espacée. Long. 9 mm. *novus* \* Mars.
- Strie subhumérale externe atteignant le milieu, sans rudiment basal. 3<sup>e</sup> strie dorsale cessant vers le milieu. Ponctuation du propygidium fine. Long. 9-11 mm. . . . . *vapulo* Mars.
60. Trois premières stries dorsales des élytres entières, la 3<sup>e</sup> parfois terminée au sommet par une ligne de points. . . . . 61.
- 3<sup>e</sup> strie dorsale basale ne dépassant pas le milieu. — Ponctuation du propygidium, vers le milieu de la base, très fine et clairsemée, presque nulle. Long. 9 mm. . . . . *ebenus* Er.
61. Strie subhumérale externe entière ou subentière, l'interne apicale courte. Long. 8-9 mm. — (*ebenninus* || Mars.) . . . . . *Marseuli* Schmid.
- Élytres sans stries subhumérales. Long. 9 mm. . . . . *intermedius* Lew.
- 62 (2). Strie marginale du mésosternum entière. — Strie fron-

(1) Je possède six exemplaires d'un *Omalodes*, venant de Bahia (Brésil), dont le pygidium est un peu plus finement ponctué au milieu de la base, mais sans qu'il présente en ce point le changement de ponctuation notable et assez brusque qui est caractéristique chez *O. omega* Kirby. J'ai été tenté de le considérer comme espèce distincte ou tout au moins comme variété de l'espèce de Kirby, mais je n'ai découvert aucun autre caractère pour séparer ces individus de *O. omega* et je crois, en définitive, qu'ils constituent simplement une forme locale de cette dernière espèce.

(2) J'ai publié un tableau du sous-genre *Cornillus* Lew. dans les *Ann. Soc. ent. Fr.* [1916], p. 311. Je n'ai rien à y changer et le reproduis ci-après, de façon à rendre complet le tableau du genre *Omalodes*.

- tale ininterrompue et acuminée en arrière. Deux premières stries dorsales des élytres entières, 3<sup>e</sup> raccourcie en avant, suturale indiquée par quelques points, subhumérale interne souvent liée à la première dorsale. Prosternum bistrié sur toute la longueur de la carène. Long. 5,75-6,25 mm. . . . . *tuberculipygus* Schmidt \*
- Strie marginale du mésosternum interrompue. . . . . 63.
63. Deux premières stries dorsales des élytres entières, 3<sup>e</sup> raccourcie en avant. — Strie frontale ininterrompue et acuminée en arrière. . . . . 64.
- Trois premières stries dorsales des élytres entières. — Strie suturale indiquée par quelques points. Stries prosternales courtes, marquées seulement soit au milieu, soit à la partie antérieure du prosternum. . . . . 66.
64. Stries prosternales aussi longues que la carène et aussi distantes l'une de l'autre en avant qu'en arrière. Long. 5,25 mm. . . . . *bullatus* Lew.
- Stries prosternales nulles ou raccourcies et seulement indiquées, dans ce dernier cas, soit au milieu, soit en avant. . . . . 65.
65. Élytres ayant seulement une strie subhumérale interne, qui est réunie au sommet à la 4<sup>re</sup> strie dorsale. Pas de strie suturale. Mésosternum sinué de chaque côté de l'échancrure médiane. Long. 8 mm. . . . . *tuberosus* Lew.
- Élytres ayant deux stries subhumérales distinctes, l'externe à peu près égale au tiers de l'élytre et située au milieu, l'interne apicale et réunie à la 4<sup>re</sup> dorsale. Une trace de strie suturale. Mésosternum non sinué en dehors de l'échancrure médiane. Long. 6 mm. . . . . *tuberculifer* \* Desh.
66. Strie frontale interrompue de chaque côté. Strie marginale du pronotum sinuée à la base, où se trouve dans chaque angle une petite impression circulaire. Surface des pro-, méso- et métasternum bien visiblement pointillée. Long. 7 mm. . . . . *binodulus* Lew.
- Strie frontale non interrompue. Strie marginale du pronotum droite à la base, où se trouve dans chaque angle une trace presque effacée d'impression. Surface des pro-, méso- et métasternum obsolètement pointillée. Long. 5,5 mm. . . . . *tuberculatus* Lew.



## DESCRIPTION DES ESPÈCES OU VARIÉTÉS NOUVELLES

*O. lucidus* var. **Le Moulti**, n. var. — *Typo simillimus, sed prosterno valde bistriato*. — Long. (capite et pygidii exclusis) 6-7,5 mm.

*Types* : sept exemplaires provenant l'un de la Guyane française (St-Jean-du-Maroni), les six autres de la Guyane anglaise. Le premier m'a été cédé par M. LE MOULT, les autres par M. H. BICKHARDT.

J'ai examiné plus de trois cents *O. lucidus* Er. Sur ce nombre, j'en ai rencontré sept dont le prosternum était aussi nettement bistrié que chez *O. bifoveolatus* Mars. (à stries non pas réduites à quelques faibles rudiments, mais bien marquées sur presque toute la longueur de la carène). Ce caractère étant loin d'être la règle dans le genre *Omalodes*, il m'a paru y avoir lieu de créer pour ces sept exemplaires une variété de l'espèce si répandue *O. lucidus* Er., dont ils ne diffèrent d'ailleurs par aucun autre caractère.

Je possède d'autres *O. lucidus* Er. provenant des mêmes localités que celles où la variété nouvelle a été récoltée et dont le prosternum ne présente aucune trace de striation. La var. *Le Moulti* ne semble donc pas être une race locale.

**O. bisulcatus**, n. sp. — *Oblongo-ovatus, convexus, niger, nitidus. Caput vix puncticulatum, fronte longitudinaliter profunde sulcata, stria circulari retrorsum acuminata. Pronotum angulis anticis punctatum, stria valde notata, pone oculos angulata. Elytrorum striae leves; subhumerali externa apicali, interna nulla; dorsalibus duabus primis integris, tertia basali dimidiata vix perspicua, ceteris deficientibus; apicali nulla. Propygidium leviter biimpressum, lateribus fortiter et dense punctatum, punctis in medio sparsis; pygidium fortiter et aequaliter punctatum. Prosternum punctulatum, in medio bistriatum; mesosterni stria late interrupta*. — Long. (capite et pygidii exclusis) 8 mm.

*Type* : un exemplaire provenant du Brésil : Sao Paulo (coll. van de Poll < coll. Desbordes).

Cette espèce est assez voisine de *O. amazonius* Mars. Elle a, comme lui, le prosternum nettement bistrié au milieu, mais les stries n'atteignent pas la base. En outre, le front est marqué d'un profond sillon longitudinal, la strie frontale est nettement rétroangulée, la ponctuation du pronotum est uniquement localisée dans les angles antérieurs et les stries dorsales internes des élytres, non plus que la strie subhumérale interne, ne sont nullement indiquées par des points apicaux.

**O. Wagneri**, n. sp. — *Oblongus, depressus, niger, nitidus. Caput*

*punctatum*, fronte longitudinaliter foveolata, stria circulari retrorsum acuminata. Pronotum lateribus fortiter denseque punctatum, stria valde notata, antice triarticulata. Elytrorum striae fortes; subhumeralibus apicalibus, externa humerum attingente, interna breviori (<sup>1</sup>); dorsalis duabus primis integris valde notatis, tertia basali dimidiata punctis raris apice aucta; suturali, vel rix notata, vel nulla; apicali deficiente. Propygidium leviter bifoveolatum, fortiter et dense punctatum, punctis ad latera majoribus; pygidium fortiter et aequaliter punctatum. Prosternum punctulatum, haud striatum; mesosterni stria late interrupta. — Long. (capite et pygidiis exclusis) 8-9 mm.

*Types* : huit exemplaires venant de la République Argentine : Chaco de Santiago del Estero, Rio Salado (E. R. WAGNER), dont cinq dans ma collection et trois dans celle du Muséum de Paris.

Cette espèce est assez voisine de *O. omega* Kirby. Elle s'en distingue aisément par la ponctuation du pygidium, qui couvre très également toute la surface sans laisser d'aire triangulaire lisse au milieu de la base et sans même que la ponctuation soit moins dense en ce point; en outre, le propygidium n'est jamais lisse en son milieu, mais seulement un peu moins densément ponctué que sur les côtés et il est marqué de deux fovéoles, à la vérité légères, mais régulièrement arrondies, tandis que le propygidium d'*O. omega* est plutôt biimpressionné, les impressions étant, lorsqu'elles sont visibles, transversales et souvent limitées en arrière par une sorte de bourrelet; les élytres ont une strie subhumérale interne bien marquée au sommet et les deux premières stries dorsales sont aussi bien enfoncées au sommet qu'à la base.

*O. Wagneri* n. sp. semble également se rapprocher de *O. felix* Lew., que je ne connais que par sa description; mais ce dernier a sur le pronotum des fossettes caractéristiques qui font défaut chez l'espèce nouvelle.

**O. Cerqueirae**, n. sp. — Oblongus, parum convexus, niger, nitidus. Caput impunctatum, fronte late impressa, stria integra antice retroangulata. Pronotum in angulis anticis tantum punctatum. Elytra foveolis fortibus et irregularibus apice notata; striis valde notatis, subhumerali externa dimidiata, interna nulla, duabus primis dorsalibus subintegris, tertia basali dimidiata, caeteris nullis. Propygidium bifoveolatum, in medio laeve, lateribus tantum sparse punctatum. Pygidium aequaliter haud dense nec fortiter punctatum, lateribus

(1) Sur deux des exemplaires *types*, on remarque en outre un rudiment de strie subhumérale interne à la base.

*utrinque valde depressum. Prosternum latum haud striatum. Mesosterni stria nulla. Tibiae anticae quadridentatae.* — Long. (capite et pygidii exclusis) 9 mm.

*Type* : un exemplaire recueilli en 1903 au Brésil (sans localité précise) par M<sup>me</sup> CERQUEIRA, à qui je me fais un devoir de dédier l'espèce (Muséum de Paris).

*O. Cerqueirae* est remarquable par l'absence totale de strie au bord de son mésosternum, caractère qui n'existe chez aucune autre espèce du genre. Je me suis même demandé si je n'avais pas affaire à une aberration individuelle et j'aurais conclu pour l'affirmative si, par l'ensemble de ses autres caractères, l'espèce nouvelle avait pu se rattacher à une autre connue; mais il n'en est rien. Cellés dont elle se rapproche le plus sont *O. angulatus* F. et *O. omega* Kirby; elle diffère de la première par sa tête lisse, concave mais non sillonnée, par sa strie frontale obtusément rétroangulée, par la dépression fovéiforme large et profonde dans laquelle vient aboutir au sommet la 2<sup>e</sup> strie dorsale des élytres, par la ponctuation de son propygidium uniquement marquée sur les côtés (comme chez *O. gaganus* Er.); d'autre part, elle se sépare de *O. omega* Kirby par une forme moins parallèle, par la bordure de points de son pronotum uniquement concentrée dans les angles antérieurs, par la ponctuation de son pygidium plus fine, mais également répartie sur toute la surface, enfin par la dépression très marquée qui se trouve vers le milieu des côtés de son pygidium et qui, en ce point, en rend la bordure nettement élevée.

#### CATALOGUE.

##### Genre *Omalodes* Er.

Erichson, apud Klug, Jahrb. Ins. (1834), p. 114.

##### Sous-genre *Omalodes* s. str.

1. *O. bifoveolatus* Mars., Mon., [1853], p. 510, t. 13, fig. 5.

Panama : Colon (!). — Colombie : Antioquia (!). — Guyane anglaise (!). — Guyane française : Cayenne (*type* de Marseul!); abondant partout (!). — Brésil : Amazone (!). — Pérou : Cumbase (!). — Paraguay (!).

2. *O. peruvianus* Mars., Mon., [1861], p. 180, t. 14, fig. 5.

Guyane française : Cayenne (!). — Pérou : Iquitos (!); Iguapo (!); Tocaché (!); Quito (*type* de Marseul!).

3. *O. mestino* Lew., Ann. Mag. Nat. Hist., (7), XIV, [1904], p. 144.

Pérou : Tumbes (G.-A. Bar),

4. *O. areolatus* Schmidt, *Ent. Nachr.*, XV, [1889], p. 363.  
Brésil : sans localité (*sec.* Schmidt).
5. *O. seriatus* Schmidt, *l. c.*, p. 364.  
Guyane française : St-Jean et St-Laurent du Maroni (!); Passoura (!); Pariacabo (!); Gourdonville (!); Nouveau-Chantier (!). — Pérou (!).  
— Brésil : sans localité précise (*sec.* Schmidt).
6. *O. bisulcatus* Desb. Voir ci-dessus, p. 56.  
Brésil : Sao Paulo (*type*!).
7. *O. amazonius* Mars., *Mon.*, [1861], p. 181, t. 14, fig. 6. — *stria  
tipectus* Lew., *Ann. Mag. Nat. Hist.*, (7), V, [1900], p. 229.  
Guyane française : Cayenne (!). — Pérou : Iquitos (!). — Brésil :  
Amazone (*type* de Marseul!).
8. *O. vitreolucens* Casey, *Ann. N. Y. Acad.*, [1893], p. 536.  
Sud de la Floride (*sec.* Casey).
9. *O. consanguineus* Mars., *Mon.*, [1853], p. 527, t. 13, fig. 20.  
Colombie : Bogota (coll. Chevrolat).
10. *O. Cerqueirae* Desb. — Voir ci-dessus, p. 57.  
Brésil (M<sup>me</sup> Cerqueira, *type*!).
11. *O. angulatus* F., *Syst. El.*, I (1801), p. 85.  
Guyane française : Cayenne (!). — Brésil : Espiritu Santo (!); Santa  
Catarina (!); Sao Paulo (É. Gounelle!).
12. *O. laevicollis* Bickh., *Ent. Blätter*, VII, [1911], p. 211.  
Colombie occidentale : S.-Antonio, 2.000 m. alt. (Fassl).
13. *O. omega* Kirby, *Trans. Linn. Soc. Lond.*, XII, [1817], p. 394.  
— *borealis* Lec., *Mon.*, (1845), p. 14, t. 1, fig. 10.  
Brésil : Para (!); Bahia (!); Espiritu Santo (!); Rio de Janeiro (!);  
Mendes (!).
14. *O. grossus* Mars., *Mon.*, [1853], p. 522, t. 15, fig. 15. — *texanus*  
Mars., *l. c.*, p. 523, t. 15, fig. 16. — *lubricans* Casey, *Ann. N. Y.  
Acad.*, VII, [1893], p. 535.  
Mexique (*type* de Marseul!). — Guatémala (L. Conradt!). —  
Costa-Rica (!). — Texas (*type* de *texanus*!).
15. *O. laceratus* Mars., *Mon.*, [1853], p. 507, t. 15, fig. 2.  
Brésil (coll. Chevrolat).
16. *O. Wagneri* Desb. — Voir ci-dessus, p. 56.  
République Argentine : Chaco de Santiago del Estero (E. et R. Wa-  
gner, *type*!).

17. *O. felix* Lew., *Ann. Mag. Nat. Hist.*, (7), V, [1900], p. 228.  
République Argentine centrale (*sec.* Lewis).
18. *O. optatus* Lew., *l. c.*, (8) VIII, [1911], p. 80.  
République Argentine : Haut Parana (Bertoni).
19. *O. vapulo* Mars., *Mon.*, [1861], p. 178, t. 14, fig. 3.  
Mexique (coll. Sallé). — Vénézuéla : Caracas (!).
20. *O. haïtianus* Mars., *Mon.*, [1853], p. 525, t. 15, fig. 18.  
Haïti : S. Domingue (Sallé, *type* de Marseul!). — Cuba (!).
21. *O. novus* Mars., *l. c.*, p. 524, t. 15, fig. 17.  
Colombie : Cartagena (*type* de Marseul!).
22. *O. planifrons* Mars., *l. c.*, p. 526, t. 15, fig. 19.  
Guyane française : Cayenne (!). — Brésil : Santa Catarina (*type* de Marseul!).
23. *O. obliquistrius* Lew., *Ann. Mag. Nat. Hist.*, (8), II, [1908], p. 142.  
Colombie : Santa Fé de Bogota (*sec.* Lewis).
24. *O. simplex* Lew., *l. c.*, p. 143.  
Trinidad (Ellacombe) (!).
25. *O. marquisicus* Mars., *Mon.*, [1853], p. 512, t. 15, fig. 6.  
Iles Marquises (*type* de Marseul!).
26. *O. foveola* Er., *apud* Klug, *Jahrb. Ins.* (1834), p. 120. — var.  
*brasilianus* Mars., *Mon.* [1853], p. 513, t. 15, fig. 7. — *couici-*  
*collis* Mars., *l. c.*, p. 519, t. 15, fig. 12.  
Colombie (!). — Guyanes anglaise, hollandaise, française, très  
répandu (!). — Pérou : Rio Toro (!). — Bolivie : S. Antonio (!).  
— Brésil, très répandu (!). — Paraguay (!).
27. *O. sobrinus* Er., *apud* Klug, *Jahrb. Ins.*, I (1834), p. 122. —  
— *rotundatus* Lec., *Proc. Acad. Philad.*, [1859], p. 311.  
Mexique (*sec.* Erichson).
28. *O. serenus* Er., *l. c.*, p. 123.  
Brésil (*sec.* Erichson).
29. *O. gagatinus* Er., in *Arch. Naturg.*, XIII, [1847], p. 90.  
Mexique (!). — Costa-Rica (!). — Panama : Colon (!). — Guyane  
française, abondant (!). — Pérou : Tocaché (G. A. Baër!). — Boli-  
vie (!). — Brésil : Espiritu Santo (!); Mendes (!).

(1) Il s'agit vraisemblablement de l'île anglaise de Trinidad située sur la côte du Vénézuéla.

30. *O. anthracinus* Mars., Mon., [1853], p. 533, t. 16, fig. 26.  
Colombie : Cartagena (!). — Vénézuéla : Caracas (*type* de Marseul!). — Brésil : Espiritu Santo (!); Mendès (!).
31. *O. praeivius* Mars., Mon., [1861], p. 176, t. 14, fig. 1.  
Panama : Colon (!). — Vénézuéla : Caracas (*type* de Marseul!).
32. *O. brevisternus* Schmidt, *Ent. Nachr.*, XIX, [1893], p. 10.  
Bolivie (Dr Drake).
33. *O. Fassli* Bickh., *Ent. Blätter*, VII, [1911], p. 212.  
Colombie : Rio Agna (Fassl.); Carmen (id.); S. Antonio (id.); Cartago (frère Bernard!).
34. *O. clavulus* Lew., *Biol. Centr.-Amer.* (1888), p. 197, t. 5, fig. 7.  
Guatemala (*sec.* Lewis).
35. *O. lucidus* Er., *apud* Klug, *Jahrb. Ins.*, I (1834), p. 120. — var.  
*Le Moulli* Desb. Voir ci-dessus, p. 56.  
Guyanes anglaise, hollandaise et française, très abondant (!); la variété provient des Guyanes anglaise et française.
36. *O. lapsans* Mars., Mon., [1861], p. 179, t. 14, fig. 4.  
Vénézuéla (*type* de Marseul!).
37. *O. punctistrius* Mars., Mon., [1853], p. 516, t. 15, fig. 10.  
Brésil (*type* de Marseul!).
38. *O. sinuaticollis* Mars., l. c., p. 535, t. 16, fig. 28.  
Brésil : Santa Catarina (*type* de Marseul!); Espiritu Santo (!).
39. *O. foveipennis* Lew., *Ann. Mag. Nat. Hist.*, [1902], p. 237.  
Brésil : Espiritu Santo (!).
40. *O. laevigatus* Quens., *apud* Schönherr, *Syn. Ins.*, I (1806), p. 190. — *angulatus* || Payk., Mon. (1811), p. 43.  
Ile St-Barthélemy (*sec.* Quensel). — Cuba (!). — Haïti (!).
41. *O. ruficlavis* Mars., Mon., [1853], p. 531, t. 16, fig. 24. — *laevigatus* || Er., *apud* Klug, *Jahrb. Ins.*, I (1834), p. 121. — *Klugi* Mars., Mon., [1861], p. 182, t. 14, fig. 7.  
Vénézuéla (!). — Haïti (*type* de *ruficlavis*!). — Cuba (*type* de *Klugi*!).
42. *O. Soulouquei* Mars., l. c., p. 184. — *laevigatus* || Mars., Mon., [1853], p. 530, t. 16, fig. 23.  
Haïti (S. Domingo!).
43. *O. laevinotus* Mars., l. c., p. 533, t. 16, fig. 25.  
Guadeloupe (*type* de Marseul!) : Ste-Lucie (Bonniecour!).
44. *O. perpolitus* Schmidt, *Ent. Nachr.*, XIX, [1893], p. 11.

- Guatemala (*sec.* Schmidt). — Costa-Rica (P. Biolley!).
45. *O. depressisternus* Mars., Mon., [1853], p. 537, t. 46, fig. 30.  
Guyane française : Cayenne (*type* de Marseul!).
46. *O. extorris* Mars., l. c., p. 528, t. 45, fig. 24.  
Guyane française : Cayenne (*type* de Marseul!).
47. *O. chapadae* Lew., *Ann. Mag. Nat. Hist.*, (8), II. [1908], p. 443.  
Brésil : Chapada (H. H. Smith).
48. *O. pulvinatus* Er., *apud* Klug, *Jahrb. Ins.*, I (1834), p. 123.  
Guyane anglaise (!). — Guyane française : S<sup>t</sup>-Jean-du-Maroni (!). — Pérou (!). — Bolivie (!). — Brésil : Amazone (!); Goyaz (!).
49. *O. monilifer* Mars., Mon., [1853], p. 520, t. 45, fig. 13.  
Mexique : Mexico (*type* de Marseul); Teapa (!).
50. *O. mendax* Mars., Mon., [1864], p. 177, t. 44, fig. 2.  
Costa-Rica (*type* de Marseul!). — Colombie (!).
51. *O. faustus* Er., *apud* Klug, *Jahrb. Ins.*, I (1834), p. 124.  
Guyane française : Gourdonville (!); Roches de Kourou (!); S<sup>t</sup>-Jean du Maroni (!). — Brésil : Amazone (!); Goyaz (!); Para (!).
52. *O. humerosus* Schmidt, *Ent. Nachr.*, XV, [1889], p. 362.  
Mexique : Medellin (*sec.* Schmidt).
53. *O. oblongus* Lew., *Ann. Mag. Nat. Hist.*, (7), VIII. [1901], p. 373.  
Brésil : São Paulo, vallée du Rio Pardo (É. Gounelle).
54. *O. exul* Mars., Mon., [1853], p. 514, t. 45, fig. 8.  
Guyane française : Cayenne (*type* de Marseul!). — Brésil : Rio de Janeiro (!); Mendes (!).
55. *O. fortunatus* Lew. *Ann. Mag. Nat. Hist.*, (7), II. [1898], p. 166.  
Brésil : Chapada; Matto Grosso (H. H. Smith). — Guyane française : S<sup>t</sup>-Jean-du-Maroni (!).

Sous-genre *Diplogrammicus* Lew.

Lewis, *Ann. Mag. Nat. Hist.*, (7), XX [1907], p. 481.

56. *O. ebeninus* Er., *apud* Klug, *Jahrb. Ins.*, I (1834), p. 448.  
Uruguay : Montevideo (*sec.* Erichson). — Brésil : Rio Grande do Sul (?).
57. *O. Marseuli* Schmidt, *Deutsche Ent. Zeitschr.*, [1889], p. 159.  
— *ebeninus* † Mars., Mon., [1853], p. 529, t. 45, fig. 22.  
Chili (*sec.* Marseul). — République Argentine : Tucuman (id.);



Territoire des Missions (Wagner!); Chaco del Estero de Santiago (id.!). — Uruguay : Montevideo (sec. Marsenl).

58. *O. intermedius* Lew., *Ann. Mag. Nat. Hist.*, (7), XX, [1907], p. 481. Chili (sec. Lewis).

Sous-genre *Cornillus* Lew.

Lewis, *Ann. Mag. Nat. Hist.*, (7), XX, [1907], p. 99. — Desbordes, *Ann. Soc. ent. Fr.*, [1916], p. 311.

59. *O. tuberculipygus* Schmidt, *Ent. Nachr.*, XV, [1889], p. 361. Brésil : Amazone (!).

60. *O. bullatus* Lew., *Ann. Mag. Nat. Hist.*, (7), XVI, [1905], p. 608. Brésil : Goyaz, Jatahy (sec. Lewis).

61. *O. tuberosus* Lew., *l. c.*, (7), IV, [1899], p. 12. Brésil (sec. Lewis).

62. *O. tuberculifer* Desb., *Ann. Soc. ent. Fr.*, [1916], p. 312. Brésil : Goyaz [Rio Verde]!.

63. *O. tuberculatus* Lew., *Ann. Mag. Nat. Hist.*, (7), XVI, [1905], p. 608.

Guyane française : Marouï (!); Gourdonville (!).

64. *O. binodulus* Lew., *l. c.*, (8), VI, [1910], p. 52. Brésil : Matto Grosso (sec. Lewis).

\* \* \*

Depuis que ce mémoire a été composé, j'ai eu à ma disposition le « *Genera des Histeridae* » publié par H. BICKHARDT, dans lequel l'auteur a élevé au rang de genres les *Cornillus* Lew. et *Diplogrammicus* Lew., qu'il n'avait admis dans son Catalogue de 1910 que comme sous-genres du genre *Omalodes*.

Je ne crois pas devoir adopter cette manière de voir. Sans doute les espèces du sous-genre *Cornillus* sont bien homogènes et se séparent des *Omalodes* s. str. par leur pygidium bituberculé; mais ce n'est pas là, à mon avis, un caractère suffisamment générique, étant donné surtout que le faciès des *Cornillus* est tout à fait analogue à celui des *Omalodes*.

On ne saurait en dire absolument autant des *Diplogrammicus*, aux-

quels le dessus du corps aplati et les élytres déprimés le long de la suture donnent un facies assez différent de celui que présentent la plupart des *Omalodes* s. str. Il se trouve cependant, parmi ces derniers, quelques espèces, telles que *O. exul* Mars. et *O. fortunatus* Lew., que leur aspect général rapproche beaucoup des *Diplogrammicus*. Je crois donc que l'on peut sans inconvénient maintenir également cette dernière coupe comme sous-genre du genre *Omalodes*.

